

Avertissements agricoles

PUBLICATION PERIODIQUE
ABONNEMENT ANNUEL

Regisseur de Recettes de la D R A F
C C P. Montpellier 5238-12 G

Bulletin destiné aux Agriculteurs du Lauragais, du Razès et de la Piège
rédigé en collaboration avec les Coopératives et les GDA

N° 4 C du 20 Mars 1990

GRANDES CULTURES N° 3

SOMMAIRE

COLZA	Charançons et Pucerons	TRAITEZ
POIS	Anthracnose et Pucerons	TRAITEZ
BLES	ATTENDEZ

COLZAS

CHARANCON DES SILIQUES

Ce ravageur vient de faire son apparition sur les cultures, les effectifs présents sont souvent très importants bien au delà du seuil de 1 charançon pour 2 plantes
A Carcassonne et aux Casses on peut observer jusqu'à 4 ou 5 de ces insectes par plante, les cultures sont toutes à un stade sensible
vous devez effectuer un contrôle dans vos parcelles à au moins 10 m de la bordure
vous les observerez dans les boutons ou dans les fleurs

MELIGETHES

Toujours observables malgré les traitements qui ont été effectués
Ceci est dû au fait de la forte pression exercée par ces ravageurs
La plupart des champs de colza ne sont plus au stade sensible
Ces insectes seront toutefois contrôlés au moment de l'application qui sera dirigée contre les charançons des siliques

PUCERONS CENDRES DU CIOU

Attention aux Pucerons; certaines cultures sont particulièrement envahies de nombreuses petites colonies qui ont maintenant tendance à gagner l'intérieur des parcelles

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

EDITION DE LA STATION LANGUEDOC-ROUSSILLON

Maison de l'Agriculture - Bâtiment 5, place Chaptal

34076 MONTPELLIER CEDEX - Tel. 67.92 41 42



Observez minutieusement vos champs de colza, dans la majorité des cas 1 traitement des bordures est suffisant; si vous constatez que les pucerons ont envahi l'intérieur des parcelles un traitement généralisé est à faire, une invasion de pucerons entraînant d'importantes baisses de rendement

COMMENT TRAITER

1° CAS : Charançons seuls

FASTAC	0,2	l/ha
TALSTAR	0,1	l
BAYTHROID	0,2	l
DECIS CE	0,2	l
SUMICIDIN	0,4	l
KARATE	0,1	l

2° CAS : Pucerons seuls

MAVRIK	0,2	l
SERK	1,5	l
PIRIMOR G	0,5	kg

3° CAS : le plus fréquent Charançons + Pucerons + (Meligèthes)

associez KARATE à 0,1 l/ha et PIRIMOR G à 0,5 kg

POIS PROTEAGINEUX

ANTHRACNOSE

On peut observer cette maladie sur la majorité des parcelles de pois, dont il convient d'assurer la protection dès à présent

PUCERONS

Ces ravageurs difficiles à observer sont présents dans tous les champs visités

Nous vous conseillons pour l'Anthraxnose une des solutions suivantes :

BRAVO PLUS	2	l/ha
ou CERECLAIR		
BTF	3,5	l
BLEDOR 3L	12,5	l
PELTAR FLO	5	l
IMPACT RM	1	l

Il convient d'ajouter à la bouillie un des insecticides suivants :

SERK	1,5	l/ha
PIRIMOR G	0,5	kg
KARATE	0,125	l
MAVRIK	0,2	l

CEREALES

ORGES : L'OIDIUM est toujours là; la ROUILLE NAINE est discrète
Sauf cas particulier à régler avec votre technicien, aucun traitement n'est à réaliser

BLES : L'OIDIUM est toujours présent mais en régression
La ROUILLE BRUNE est pratiquement absente, les conditions climatiques sont particulièrement défavorables à cette maladie

AUCUN TRAITEMENT DANS L'IMMEDIAT